

# PREVALÊNCIA DE MALOCLUSÕES EM CRIANÇAS E SUA ASSOCIAÇÃO COM HÁBITOS BUCAIS DELETÉRIOS

Jadson Mathyas Domingos da SILVA<sup>1</sup>; (PROBIC-UNIT),  
[jadsondomingues0@gmail.com](mailto:jadsondomingues0@gmail.com)

Ana Cláudia Ramos PINTO<sup>1</sup>; (PROBIC-UNIT), [anaclaudiaramosp@gmail.com](mailto:anaclaudiaramosp@gmail.com)

Mariana Josué RAPOSO<sup>1</sup> (orientadora), [marianajraposo@hotmail.com](mailto:marianajraposo@hotmail.com)

<sup>1</sup>Centro Universitário Tiradentes, UNIT\ Odontologia\ AL;

Graduação em Odontologia, Maceió - AL

Área: 4.00.00.00-1 Ciências da Saúde; Subárea: 4.02.00.00-0 Odontologia

## RESUMO

**INTRODUÇÃO:** As maloclusões ocupam a terceira posição em relação às prioridades na escala de problemas de saúde bucal do Brasil, estando bastante frequente em crianças com dentição decídua ou mista, devido a atitudes comportamentais, como o desmame precoce e a frequência de hábitos bucais deletérios. Assim, além da identificação de hábitos bucais deletérios e suas respectivas relações com as maloclusões em crianças de comunidades carentes, necessita-se de intervenções que vão além da educação em saúde convencional, uma vez que podem gerar grande impacto na qualidade de vida dos indivíduos que as possuam, sendo o cirurgião-dentista, o profissional mais habilitado para uma interferência positiva na remoção ou a não habituação desses hábitos. **OBJETIVO:** Este trabalho visa analisar por exame clínico, as principais maloclusões que acometem escolares de 9 a 13 anos, matriculados numa escola da rede municipal de ensino de Maceió – AL, e sua relação com hábitos bucais deletérios. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo quantitativo analítico transversal, onde, após o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa e concordância dos pais ao assinarem o Termo De Consentimento Livre e Esclarecido, e das crianças ao concordarem com o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido sobre a participação dos indivíduos no estudo, serão realizados 4 encontros para a realização do exame clínico, sendo examinados 25 participantes por encontro, totalizando uma amostra de 100 indivíduos. Os recursos de fotografias e avaliação intrabucal com uso de uma espátula de madeira serão utilizados a fim de auxiliarem na análise dos dados. Não se tem resultados ainda, visto que está em processo de aceite do Comitê de Ética em Pesquisa.

**Palavras-chave:** Maloclusão; Hábitos deletérios; Saúde bucal.

## ABSTRACT:

**INTRODUCTION:** Malocclusion occupies the third position in relation to priorities in the scale of oral health problems in Brazil, being quite common in children with deciduous or mixed dentition due to attitudes behaviors, such as early weaning and frequency of oral habits deleterious. Thus, besides the identification of deleterious oral habits and their related to malocclusion in

children of need for interventions that go beyond health education since they can have a great impact on the quality of life of the individuals who have them, being the dental surgeon the most professional positive interference in removal or non-habituating of these habits. **OBJECTIVES:** This study aims at analyzing by clinical examination the main malocclusions that affect 9 - to 13 - year - old schoolchildren, enrolled in a school in the Maceió municipal school system - AL, and its relationship with deleterious oral habits. **METHODOLOGY:** This is a quantitative cross-sectional analytical study where, after the opinion of the Research Ethics Committee and the parents' agreement to sign the Free and Informed Consent Term, and the children agreeing to the Free and Informed Consent Form about the participation of the individuals in the study, 4 meetings will be held to perform the clinical exam, 25 participants were examined per meeting, totaling a sample of 100 individuals. The resources of photographs and intraoral evaluation with the use of a wooden spatula will be used in order to assist in the analysis of the data. There are no results yet, since it is in the process of being accepted by the Research Ethics Committee.

**Keywords:** Malocclusion; deleterious habits; Oral health.

**Referências:**

Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da Criança: nutrição infantil. Aleitamento materno e alimentação complementar. Normas e manuais técnicos. **Cadernos de Atenção Básica 23**. Brasília (DF): Editora MS; 2009;

OLIVEIRA I. M. de, JÚNIOR A. M. C, CAVALCANTE M. M. A. de S, SILVA A. B. S. da, RIZZO M. dos S.; LEITE C. M. de C. Saberes Maternos Sobre a Relação entre Amamentação Natural e Hábitos Bucais Deletérios. **J Health Sci**. V. 18, n. 2, p: 75-9, 2016;

PEREIRA, M. R, JARDIM, L. E, FIGUEIREDO, M. E, FAUSTINO-SILVA, D. D. Prevalência de má oclusão em crianças de quatro anos de idade e fatores associados na Atenção Primária à Saúde. **Stomatos**, V. 23, N. 45, 2017;

SOUSA, Jossaria Pereira de; SOUSA, Simone Alves de. Prevalência de má oclusão em escolares de 7 a 9 anos de idade do Polo 1 da Rede Municipal de Ensino em João Pessoa-PB. **Rev. odontol. UNESP**, Araraquara, v. 42, n. 2, p. 117-123, 2013.