

INTERNAÇÕES POR TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDO AO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM ALAGOAS.

Ravanne Lanna Rodrigues Ventura¹ (PROVIC-UNIT), e-mail:

ravanne_lanna@hotmail.com;

Anacássia Fonseca de Lima¹ (Orientadora), e-mail:

anacassia.fonseca@souunit.com.br;

Centro Universitário Tiradentes¹/Biomedicina/Alagoas, AL.

Área de conhecimento: 4.00.00.00-1 - Ciências da Saúde

Subárea de conhecimento: 4.06.00.00-9 - Saúde Coletiva

RESUMO: Introdução: As substâncias psicoativas ficaram conhecidas por sua capacidade de alterar as funções do sistema nervoso central. Mais de 19 milhões de pessoas do mundo sofreram algum tipo de distúrbio relacionado as SPAs e cerca de 207.400 pessoas vieram a óbito. Essas drogas agem intensificando e simulando a ação dos neurotransmissores, com efeitos estimulantes, depressores e perturbadores. Os mecanismo do cérebro de gratificação e recompensa são afetados, o que induz o indivíduo a usar repetidamente. Não há padrão, quantidade ou nível seguro para o consumo esporádico ou frequente, os danos fisiológicos são imediatos, o que pode causar intoxicação e overdose. O consumo de drogas é uma prática extremamente danosa, o que justifica a proibição de algumas substâncias pelo judiciário. **Objetivo:** O objetivo dessa pesquisa foi quantificar as internações e determinar o perfil epidemiológico de indivíduos internados por transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas em Alagoas. **Metodologia:** O Estudo foi realizado por meio de coleta e análise de dados da 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID 10) e do Sistema de Informação de Saúde (TABNET), quantificando o número de casos confirmados através das variáveis: raça, gênero e faixa etária. Após serem sistematizados e organizados em tabela no programa Microsoft Excel 2007, foi realizada uma análise descritiva com as respectivas variáveis coletadas, durante o período de janeiro de 2015 a junho de 2019. **Resultados:** Houve um total de 2125 internamentos, dos quais, 1687 abrangeram pessoas do sexo masculino (79%), e 438 pessoas do sexo feminino (21%). A faixa etária em destaque foi de 20 a 29 anos com 809 hospitalizações (39%), seguida do grupo de 30 a 39 anos com 492 internações (23%). Embora a informação sobre cor da pele tenha sido omitida em 766 casos (36%), a cor parda foi a mais frequente com 1211 ocorrências (57%). Constatou-se aumento significativo em cada ano estudado, com uma média de 475 internações por ano. **Discussão:** Assim como ALMEIDA et al (2014) observou predominância de internações por pacientes do sexo masculino, de cor parda, com a faixa etária de 21 aos 31 anos, em pesquisa realizada em João Pessoa, percebemos que em Alagoas durante o período de 2015 ao primeiro semestre de 2019, esse perfil também se mantém. **Conclusão:** Observou-se que o perfil com maior quantidade de casos registrados de internações por uso de substâncias psicoativas em

Alagoas, foram pessoas do sexo masculino, na faixa etária de 20 a 29 anos, de cor parda.

Palavras-chave: consumo, epidemiologia, internamento.

ABSTRACT:Introduction: Psychoactive substances were known for their ability to alter the functions of the central nervous system. More than 19 million people in the world suffered some kind of disturbance related to SPAs and about 207,400 people died. These drugs act intensifying and simulating the action of neurotransmitters, with stimulating, depressants and disturbing effects. The mechanism of the brain of gratification and reward is stimulated, which induces the individual to use repeatedly. There is no standard, quantity or level safe for sporadic or frequent consumption, physiological damage is immediate, which can cause intoxication and overdose. Drug use is an extremely harmful practice, which justifies the prohibition of some substances by the judiciary. **Objective:** The objective of this research was to quantify hospitalizations and to determine the epidemiological profile of individuals hospitalized for mental and behavioral disorders due to the use of psychoactive substances in Alagoas. **Methodology:** The study was conducted through data collection and analysis of the 10th revision of the International Classification of Diseases (ICD 10) and the Health Information System (TABNET), quantifying the number of confirmed cases through the variables: race, gender and Age group. After being systate and organized in a table in the Microsoft Excel 2007 program, a descriptive analysis was performed with the respective variables collected, during the period from January 2015 to June 2019. **Results:** There were a total of 2125 internamentos, of which 1687 covered male (79%), and 438 female (21%) people. The age bracket was 20 to 29 years with 809 hospitalizations (39%), followed by the group of 30 to 39 years with 492 hospitalizations (23%). Although information on skin color was omitted in 766 cases (36%), brown color was the most frequent with 1211 occurrences (57%). A significant increase was observed in each studied year, with an average of 475 hospitalizations per year. **Discussion:** Just as ALMEIDA et al (2014) observed a predominance of hospitalizations for male patients, of brown color, with the age group from 21 to 31 years, in a research conducted in João Pessoa, we noticed that in Alagoas during the period of 2015 to the first Semester of 2019, this profile is also maintained. **Conclusion:** It was observed that the profile with the highest number of registered cases of hospitalizations due to the use of psychoactive substances in Alagoas, were male individuals, in the age range of 20 to 29 years, of brown color.

Keywords: consumption, epidemiology, internation.

Referências/references:

ABREU, Angela Maria Mendes et al . PERFIL DO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E SUA RELAÇÃO COM AS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA INTERVENÇÃO BREVE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RIO DE JANEIRO, BRASIL. **Texto contexto - enferm.**, Florianópolis , v. 25, n. 4, e1450015, 2016 .

ALMEIDA, Rosilene Alves de et al . Perfil dos usuários de substâncias psicoativas de João Pessoa. **Saúde debate**, Rio de Janeiro , v. 38, n. 102, p. 526-538, Sept. 2014 .

CONCEICAO, Déborah Santos et al . Atendimentos de crianças e adolescentes com transtornos por uso de substâncias psicoativas nos Centros de Atenção Psicossocial no Brasil, 2008-2012. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília , v. 27, n. 2, e2017206, 2018

FERNANDES, Thaís Ferraz et al . Uso de substâncias psicoativas entre universitários brasileiros: perfil epidemiológico, contextos de uso e limitações metodológicas dos estudos. **Cad. saúde colet.**, Rio de Janeiro , v. 25, n. 4, p. 498-507, Dec. 2017 .

FERREIRA, Bruna Araújo de Melo et al. O USO E ABUSO DA COCAÍNA: EFEITOS NEUROFISIOLÓGICOS. **Ciências Biológicas e de Saúde Unit** , Alagoas, v. 4, n. 2, p. 359-370, Nov. 2017 .

IORE, Maurício. O lugar do Estado na questão das drogas: o paradigma proibicionista e as alternativas. **Novos estud. - CEBRAP**, São Paulo , n. 92, p. 9-21, Mar. 2012 .

GUERRA, Marcella Regina Silva Rieiro; VANDENBERGHE, Luc. Abordagem do comportamento de uso abusivo de substâncias psicoativas no Brasil: o estado da arte. **Pesqui. prá. psicossociais**, São João del-Rei , v. 13, n. 1, p. 1-22, 2018 .

GUSMÃO, Priscilla De Paula et al . Perfil epidemiológico de uma população de usuários de drogas de Anápolis, Goiás. **Rev. Educ. Saúde** v.5 n. 1, p. 28-37, 2017.

LACERDA, Bruno Moura et al . PERFIL DE USUÁRIOS DE DROGAS EM CENTROS TERAPÊUTICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE . **Rev. Ciênc. Saúde Nova Esperança**, SI , v 13, n. 1 , p. 54-65 , Jun. 2015.

SANTOS, Adrielle Rodrigues dos et al . INSTRUMENTOS RELACIONADOS AO CONSUMO DE DROGAS EM ADOLESCENTES: REVISÃO INTEGRATIVA. **Texto contexto - enferm.**, Florianópolis , v. 27, n. 3, e0370017, 2018 .