

## FRAGILIDADES E VULNERABILIDADES DAS GESTANTES AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO.

José Anderson Nunes Duarte<sup>1</sup> (Unit), e-mail: jose.anunes@souunit.com.br  
Lucas Barbosa de Macedo Ferreira<sup>2</sup>(UNIT), e-mail: JI154511@gmail.com  
Lara Beatriz Nunes e Silva<sup>3</sup> (Unit), e-mail: beatriznunes3@hotmail.com  
Jefferson Santos Lima <sup>4</sup> (UNIT),e-mail :Jefferson\_lima\_2@hotmail.com  
Mateus Duarte Araújo Liberato<sup>5</sup> (UNIT), e-mail: mateus.liberato2015@gmail.com  
Ana Claudia Garcia de Medeiro santandrea<sup>1</sup> (Orientador), e-mail:  
anakk\_andre@hotmail.com

José Anderson Nunes Duarte <sup>1</sup>/Odontologia/ Maceió - AL.  
Lucas Barbosa de Macedo Ferreira <sup>2</sup>/Odontologia/ Maceió- AL  
Lara Beatriz Nunes e Silva<sup>3</sup> / Odontologia/ Maceió - AL.  
Jefferson Santos Lima <sup>4</sup> / Odontologia/ Maceió - AL.  
Mateus Duarte Araújo Liberato<sup>5</sup>/Odontologia/ Maceió - AL.  
Ana Claudia Garcia de Medeiro santandrea<sup>3</sup>/ Farmácia/ Maceió - AL  
(Centro Universitário Tiradentes), Maceió e Alagoas.

4.00.00.00-1 Ciências da Saúde 4.02.00.00-0 Odontologia

### RESUMO:

**Introdução:** A gravidez é um período único na vida da mulher em que a deixa mais vulnerável e frágil por é caracterizada por intensas mudanças fisiológicas que se manifestam na cavidade oral como por exemplo aumento da atividade hormonal, aumento do débito cardíaco e aumento da pressão arterial. **Objetivo:** Analisar a literatura acerca das fragilidades e vulnerabilidades das gestante ao atendimento odontológico. **Metodologia:** trata-se de uma revisão da literatura, dados obtidos nas bases de dados scielo e pubmed. **Resultados:** os resultados do presente estudo mostram que as existem alterações comumente encontradas nas gestantes como: manifestações gengivais devido as alterações hormonais e pode progredir para uma periodontite, granuloma piogênico patologia comum entre as gestantes, erosões dentarias ocasionadas por refluxo gástrico e o surgimento de lesões cariosas sofrem algumas mudanças fisiológicas como alterações nas glândulas salivares ocasionando um quadro de xerostomia que ocasiona o desenvolvimento de lesões cariosas. **Conclusão:** conclui-se que o a gestação em se não impede na questão do atendimento, deve se se atentar que a condição de gestante requer uma maior atenção, em relação aos procedimentos mais invasivos recomendasse esperar ate após o parto, o primeiro e o terceiro trimestre de gestação são os mais perigosos já o segundo trimestre é o mais indicado para atendimento. Dessa forma o cirurgião dentista deve estar atento aos sinais de possíveis manifestações bucais e ter um maior cuidado com a gestante e seu bebe.

---

<sup>1</sup> jose.anunes@souunit.com.br

<sup>2</sup> beatriznunes3@hotmail.com

<sup>4</sup> Jefferson\_lima\_2@hotmail.com

<sup>5</sup> mateus.liberato2015@gmail.com

<sup>6</sup> anakk\_andre@hotmail.com

**ABSTRACT:**

**Introduction:** Pregnancy is a unique period in the life of women in which it leaves it more vulnerable and fragile because it is characterized by intense physiological changes that manifest in the oral cavity as for example increased hormonal activity, increased cardiac debito and Increased blood pressure. **Objective:** To analyze the literature on the fragilities and vulnerabilities of pregnant women to dental care. **Methodology:** This is a literature review, data obtained from the Scielo and PubMed databases. **Results:** The results of the present study show that there are alterations commonly found in pregnant women such as: gingival manifestations due to hormonal changes and may progress to a periodontitis, pyogenic granuloma Common pathology between The pregnant women, toothed erosions caused by gastric reflux and the emergence of carious lesions undergo some physiological changes such as alterations in the salivary glands causing a xerostomy picture that causes the development of lesions Carious. **Conclusion:** It is concluded that the pregnancy in itself does not prevent the question of care, should be aware that the condition of pregnant women requires greater attention, in relation to the most invasive procedures recommended to wait until after childbirth, the first and the third Trimester of gestation are the most dangerous, the second trimester is the most suitable for attendance. Thus the dentist should be attentive to the signs of possible oral manifestations and be more careful with the pregnant woman and her baby.

**Keywords:** *Gestant, dentistry, odontological Care.*

**Referências/references:**

Oliveira et al. Atendimento odontológico a gestantes: a importância do conhecimento da saúde bucal. **Revista de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde**, Três Corações, v. 4, n. 1, p. 11-23. 2014

Codato et al. Atenção odontológica à gestante: papel dos profissionais de saúde. **Rev. Ciência & Saúde Coletiva**, n. 16, v. 4, p. 2297-2301. 2011